

## **Paralisi Sopranucleare Progressiva**

<b>Criteri di inclusione</b>	<b>Criteri di esclusione</b>	<b>Criteri suggestivi</b>
Parkinsonismo progressivo	Anamnesi recente di encefalite	Rigidità ed acinesia simmetrica prevalentemente prossimale
Esordio dopo i 40 anni	Allucinazioni o deliri	Anomala postura del collo in particolare retrocollo
Paralisi dello sguardo verticale	Demenza ad espressione corticale suggestiva per malattia di Alzheimer	Scarsa o assente risposta del parkinsonismo alla levodopa
Prominente instabilità posturale con cadute nel primo anno di malattia	Precoci e preponderanti segni cerebellari o disautonomici	Esordio precoce di deficit cognitivo di tipo sottocorticale
Assenza di altre malattie che possono spiegare il quadro clinico	Parkinsonismo marcatamente asimmetrico	
	Rilievo neuro-radiologico di importanti lesioni vascolari nei nuclei della base o nel tronco encefalico	

Litvan I, Agid Y, Calne D et al. Clinical research criteria for the diagnosis of progressive supranuclear palsy (Steele-Richardson-Olszewski syndrome): report of the NINDS-SPSP International Workshop. Neurology 1996;47:1-9.